Nota sobre Epistor lugubris

por FEDERICO NOSSWITZ

A principios de Diciembre de 1927 encontré en mi jardín, sobre una viña silvestre cinco pequeñas orugas que me interesaron por serme desconocidas, por lo cual las coloqué en el insectarium para observarlas.

Eran de color amarillo verdoso y con un apéndice caudal alargado y adelgazado gradualmente como puede verse en la lámina figs. 1 y 2. Se desarrollaron rápidamente, pues se alimentaban bien; después de la primera muda, el dorso tomó un color claro y los costados se tornaron más verdes; pude constatar cuatro mudas.

En la época de su desarrollo completo el dorso era casi totalmente blanco como empolvado y los costados de color verde vivo. A fin de Febrero de 1928 crisalidaron casi a flor de tierra bajo las hojas secas.

La primera eclosión se hizo a mediados de Octubre de 1928 pudiendo determinar entonces la especie como *Epistor lugubris* L., en poco tiempo eclosionaron los cuatro restantes obteniendo una hembra y cuatro machos, no fué posible observar la cópula ni en jaula grande ni en jaula chica, pues los machos volaban inquietos, día y noche, en el lado opuesto a la hembra, estropeándose las alas en pocos días.

Este esfingido y su biología han sido descriptos ya varias veces:

Linne, Mant. Plant. pág. 537. (1771)

M. Abbot y Smith, Ins. Georg. 1., pág. 59, pl. 30.

Burmeister, Sphing. Bras. pág. 772, (1856)

Edwards, pág. 772, (1856).

Rotschild & Jordan, Rev. Sphing. pág. 404.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1930.


1
2
3
4
5
6
Epicles lugubris Piné
1 y 2 Orugas
3 Imago Hembra
4 Imago Macho
5 y 6 Crisalidas
Fot. Luiz y Ferrando.